



PROFILAXIS FRENTE AL PALUDISMO/MALARIA ATOVACUONA-PROGUANIL

Para prevenir el paludismo/malaria en la zona que usted viaja se recomienda tomar ATOVACUONA-PROGUANIL

Dosis recomendada: 1 comprimido **diario** (en personas de más de 40 kg de peso), ingerido con alimentos, preferentemente de contenido graso, y abundante líquido, o con leche entera, después del desayuno, dejando transcurrir una hora antes de acostarse o tumbarse.

- iniciándose 24 o 48 horas **antes** de entrar en una zona geográfica donde el paludismo sea endémico
- continuando **diariamente** durante el período de **estancia**.
- continuando **diariamente** durante 7 días **después** de abandonar dicha zona.

De presentarse vómitos durante la 1ª hora posterior a su toma, repetirla.

Efectos secundarios: los más frecuentes son dolor de cabeza y trastornos gastrointestinales.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes del medicamento e insuficiencia renal grave No administrar conjuntamente con rifampicina, tetraciclinas ni metoclopramida. No hay estudios sobre su utilización en embarazo. No debe usarse en periodo de lactancia.

NO DEBE OLVIDAR QUE:

Ninguna profilaxis antipalúdica asegura una protección completa, por lo que la primera defensa frente a la enfermedad es evitar la picadura de mosquitos.

Embarazadas, niñas y niños son especialmente susceptibles de padecer un paludismo grave.

En caso de que aparezca fiebre, dolores articulares, malestar general o diarrea desde una semana después de entrar en zona de riesgo o hasta tres meses después de abandonarla, se debe acudir a consulta médica para descartar una posible malaria.

En caso de que aparezca algún efecto secundario grave, debe interrumpir la medicación y acudir a consulta médica.

Leer con detenimiento el prospecto del medicamento.