



PROFILAXIS FRENTE AL PALUDISMO/MALARIA

DOXICICLINA 100 mgr

Para prevenir el paludismo/malaria en la zona que usted viaja se recomienda tomar DOXICICLINA 100 mgr.

Dosis recomendada: 1 comprimido **diario** (en personas de más de 45 kg de peso), ingerida con alimentos y abundante líquido, después del desayuno, dejando transcurrir una hora antes de acostarse o tumbarse.

- iniciándose **24 o 48 horas antes** de entrar en una zona geográfica donde el paludismo sea endémico.
- continuando **diariamente** durante el período de **estancia**.
- continuando **diariamente** hasta **28 días después** de abandonar dicha zona.

Efectos secundarios: los más frecuentes son dolor de cabeza y náuseas y vómitos, fotosensibilidad e infecciones por hongos.

Contraindicaciones: hipersensibilidad a la doxiciclina o a otras tetraciclinas, o a alguno de los excipientes contenidos en su formulación, y uso simultáneo de metoxiflurano (anestésico). Disminuye la eficacia de los anticonceptivos orales y aumenta los de los anticoagulantes. No debe tomarse simultáneamente con antiácidos ni preparados con hierro. No usarse en periodo de embarazo o lactancia.

NO DEBE OLVIDAR QUE:

Ninguna profilaxis antipalúdica asegura una protección completa, por lo que la primera defensa frente a la enfermedad es evitar la picadura de mosquitos.

Embarazadas, niños y niñas son especialmente susceptibles de padecer un paludismo grave.

En caso de que una semana después de entrar en zona de riesgo, o hasta tres meses después de abandonarla, aparezca fiebre, dolores articulares, malestar general o diarrea, acuda a consulta médica para descartar una posible malaria.

En caso de que aparezca algún efecto secundario grave, debe interrumpir la medicación y acudir a consulta médica.

Leer con detenimiento el prospecto del medicamento.