



PROFILAXIS FRENTE AL PALUDISMO/MALARIA MEFLOQUINA (LARIAM)

Para prevenir el paludismo/malaria en la zona que usted viaja se recomienda tomar MEFLOQUINA (LARIAM), disponible en España como medicación extranjera.

Dosis recomendada: 1 comprimido de 250 mgr. (personas con peso superior a 45 kg) **a la semana**, siempre el mismo día de la semana, ingerido con alimentos y abundante líquido y sin masticar.

- iniciándose una semana **antes** de entrar en zona geográfica de riesgo para malaria.
- continuando **un comprimido semanal** durante el período de **estancia**.
- continuando **un comprimido semanal** durante 4 semanas **después** de abandonar dicha zona.

Efectos secundarios: los más frecuentes son dolor de cabeza y trastornos gastrointestinales y del sueño.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes del medicamento, antecedentes de enfermedad psiquiátrica, incluida depresión, arritmia cardíaca, alteración hepática grave, cuadros convulsivos.

NO DEBE OLVIDAR QUE:

Ninguna profilaxis antipalúdica asegura una protección completa, por lo que la primera defensa frente a la enfermedad es evitar la picadura de mosquitos.

Embarazadas, niñas y niños son especialmente susceptibles de padecer un paludismo grave.

En caso de que aparezca fiebre, dolores articulares, malestar general o diarrea desde una semana después de entrar en zona de riesgo o hasta tres meses después de abandonarla, se debe acudir a consulta médica para descartar una posible malaria.

En caso de que aparezca algún efecto secundario grave, debe interrumpir la medicación y acudir a consulta médica.

Leer con detenimiento el prospecto del medicamento.

SE DISPENSA EN: **FARMACIA DE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS**
C/ SAGASTA 6 METRO BILBAO HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9 A 2.

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN – CENTRO SALUD INTERNACIONAL