



## PROFILAXIS FRENTE AL PALUDISMO/MALARIA CLOROQUINA (RESOCHIN)

Para prevenir el paludismo/malaria en la zona que usted viaja se recomienda tomar CLOROQUINA (RESOCHIN).

**Dosis recomendada:** 2 comprimidos juntos a la **semana**, siempre el mismo día de la semana, ingeridos después de la comida con un vaso de agua.

- iniciándose una semana **antes** de entrar en una zona geográfica donde el paludismo sea endémico.
- continuando **semanalmente**, durante el período de **estancia**.
- continuando **semanalmente** hasta 4 semanas **después** de abandonar dicha zona.

**Efectos secundarios:** trastornos gastrointestinales (náuseas y vómitos, dolor abdominal, falta de apetito, diarrea, disminución de peso), alteraciones de la visión.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes contenidos en su formulación, porfiria, psoriasis, retinopatía, miastenia, arritmias cardíacas. No utilizar simultáneamente con antiácidos, corticoides, metrotexato. **Evitar el embarazo durante su toma y hasta tres meses después.** No debe usarse en periodo de lactancia.

### NO DEBE OLVIDAR QUE:

Ninguna profilaxis antipalúdica asegura una protección completa, por lo que la primera defensa frente a la enfermedad es evitar la picadura de mosquitos.

Embarazadas, niños y niñas son especialmente susceptibles de padecer un paludismo grave.

En caso de que una semana después de entrar en zona de riesgo, o hasta tres meses después de abandonarla, aparezca fiebre, dolores articulares, malestar general o diarrea, acuda a consulta médica para descartar una posible malaria.

En caso de que aparezca algún efecto secundario grave, debe interrumpir la medicación acudir a consulta médica.

**Se debe leer con detenimiento el prospecto del medicamento.**