



VACUNA FRENTE A LA FIEBRE TIFOIDEA: VIVOTIF

La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa bacteriana producida por *Salmonella Typhi*, que se transmite por consumo de agua y alimentos contaminados.

Su distribución es universal, pero mucho más frecuente en países de África, Asia, América Central y del Sur y algunas zonas rurales del Mediterráneo Oriental.

VACUNA ORAL-VIVOTIF	
Indicaciones	Mayores de 5 años que se dirijan a zonas endémicas.
Tipo de vacuna	Cepa atenuada <i>Salmonella Typhi Ty21a</i> .
Pauta de vacunación	Tres cápsulas administradas a lo largo de 5 días, los días 1,3 y 5. Se toman con líquidos fríos y una hora antes de la comida.
Eficacia	Es eficaz a partir de los 15 días del comienzo de su administración. El tiempo mínimo de protección es de 3 años.
Contraindicaciones	Evitar tomar antibióticos, sulfonamidas y medicamentos para la prevención de la malaria, desde tres días mínimo antes de la administración y hasta tres días mínimo después.
Efectos secundarios	Cefaleas, trastornos gastrointestinales, fiebre, exantema (entre un 1% y un 10% de las ocasiones)
CONSERVACIÓN	DEBE CONSERVARSE EN FRÍO (Desde su compra hasta su toma)

NO DEBE OLVIDAR QUE:

Es recomendable comenzar la toma de la vacuna al menos 15 días antes de llegar a la zona de riesgo.

Es importante seguir las medidas higiénicas con el agua y la alimentación