

PROFILAXIS FRENTE AL PALUDISMO/MALARIA
MEFLOQUINA (LARIAM)

العلاج الوقائي للملاريا
مفلوكينا (لاريام)

<p>Para prevenir el paludismo/malaria en la zona que usted viaja se recomienda tomar MEFLOQUINA (LARIAM), disponible en España como medicación extranjera.</p> <p>Dosis recomendada: 1 comprimido de 250 mgr. (personas con peso superior a 45 kg) a la semana, siempre el mismo día de la semana, ingerido con alimentos y abundante líquido y sin masticar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • iniciándose una semana antes de entrar en zona geográfica de riesgo para malaria. • continuando un comprimido semanal durante el período de estancia. • continuando un comprimido semanal durante 4 semanas después de abandonar dicha zona. <p>Efectos secundarios: los más frecuentes son dolor de cabeza y trastornos gastrointestinales y del sueño.</p> <p>Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes del medicamento, antecedentes de enfermedad psiquiátrica, incluida depresión, arritmia cardiaca, alteración hepática grave, cuadros convulsivos.</p>	<p>لوقاية من الملاريا بالمناطق التي ستسافر إليها ينصح بتناول دواء المفلوكينا لاريام المتوفر بإسبانيا كدواء اجنبي.</p> <p>الجرعة الموصى بها: قرص واحد 250 ملغ (للأشخاص الذي يبلغ وزنهم أكثر من 45 كغ) أسبوعياً، دائماً في نفس اليوم من الاسبوع ويتم تناوله مع الأكل وكثير من السوائل ودون مضغه.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ويتم البدء في تناوله قبل اسبوع من الدخول الى المناطق الجغرافية التي يوجد بها خطر مرض الملاريا. • يتم الاستمرار بتناول قرص واحد اسبوعياً خلال فترة الإقامة. • يتم الاستمرار بتناول قرص واحد اسبوعياً خلال أربعة (4) اسابيع بعد مغادرة هذه المنطقة. <p>الاعراض الجانبية: الأكثر شيوعاً هي آلام الرأس واضطرابات معدية معوية واضطراب النوم.</p> <p>موانع الاستعمال: فرط الحساسية من المكون النشط أو بعض السواغات الخاصة بالدواء ولسوايق تتعلق بأمراض نفسانية وعقلية بما في ذلك الاكتئاب وعدم انتظام ضربات القلب واضطراب الكبد الشديد ونوبات التشنج .</p>
<p>NO DEBE OLVIDAR QUE:</p> <p>Ninguna profilaxis antipalúdica asegura una protección completa, por lo que la primera defensa frente a la enfermedad es evitar la picadura de mosquitos.</p> <p>Embarazadas, niñas y niños son especialmente susceptibles de padecer un paludismo grave.</p>	<p>لا يجب ان تنسى انه</p> <p>لا يضمن اي علاج وقائي مضاد للملاريا الحماية الكاملة لذلك فأول دفاع لمكافحه هذا المرض هو تحاشي لدغة البعوض.</p> <p>ان الحوامل والاطفال بصفه خاصة هم معرضون للإصابة بالملاريا الخطيرة.</p>

<p>En caso de que aparezca fiebre, dolores articulares, malestar general o diarrea desde una semana después de entrar en zona de riesgo o hasta tres meses después de abandonarla, se debe acudir a consulta médica para descartar una posible malaria.</p> <p>En caso de que aparezca algún efecto secundario grave, debe interrumpir la medicación y acudir a consulta médica.</p> <p>Leer con detenimiento el prospecto del medicamento</p>	<p>في حالة ما إذا ظهرت الحمى أو ألم المفاصل أو توعك عام أو اسهال بداية من الاسبوع الأول بعد الدخول الى منطقة الخطر او حتى بعد ثلاثة اشهر من مغادرتها فيجب الذهاب الى العيادة الطبية لاستبعاد امكانية الإصابة بمرض الملاريا.</p> <p>في حالة ما إذا ظهرت اي أعراض جانبية خطيرة يجب التوقف عن استعمال الدواء والذهاب الى العيادة الطبية</p> <p>اقرا بعناية الروشنة الطبية الخاصة بالدواء بعناية.</p>
<p>SE DISPENSA EN: FARMACIA DE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS C/ SAGASTA 6 METRO BILBAO</p> <p>HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9 A 2.</p> <p>SERVICIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCION – CENTRO SALUD INTERNACIONAL</p> <p>Montesa, 22, Edif. A Planta Baja – 28006 MADRID</p>	<p>يتوفر بصيدلية الادوية الأجنبية العنوان: C/ SAGASTA 6 MADRID Bilbao: مترو</p> <p>التوقيت من الاثنين الى الجمعة من الساعة 9:00 الى الساعة 14:00 مساء</p> <p>خدمة الوقاية والترويج- مركز الصحة الدولية</p> <p>Montesa, 22, Edif. A Planta Baja – 28006 MADRID</p>