

## PROFILAXIS FRENTE AL PALUDISMO/MALARIA

## DOXICICLINA 100 mgr

العلاج الوقائي للملاريا

دوكسيكلينا 100مغ

<p>Para prevenir el paludismo/malaria en la zona que usted viaja se recomienda tomar DOXICICLINA 100 mgr.</p> <p><b>Dosis recomendada:</b> 1 comprimido diario (en personas de más de 45 kg de peso), ingerida con alimentos y abundante líquido, después del desayuno, dejando transcurrir una hora antes de acostarse o tumbarse.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• iniciándose 24 o 48 horas antes de entrar en una zona geográfica donde el paludismo sea endémico.</li><li>• continuando diariamente durante el período de estancia.</li><li>• continuando diariamente hasta 28 días después de abandonar dicha zona.</li></ul> <p><b>Efectos secundarios:</b> los más frecuentes son dolor de cabeza y náuseas y vómitos, fotosensibilidad e infecciones por hongos.</p> <p><b>Contraindicaciones:</b> hipersensibilidad a la doxiciclina o a otras tetraciclinas, o a alguno de los excipientes contenidos en su formulación, y uso simultáneo de metoxiflurano (anestésico). Disminuye la eficacia de los anticonceptivos orales y aumenta los de los anticoagulantes. No debe tomarse simultáneamente con antiácidos ni preparados con hierro. No usarse en periodo de embarazo o lactancia.</p> <p><b>NO DEBE OLVIDAR QUE:</b> Ninguna profilaxis antipalúdica asegura una protección completa, por lo que la primera</p>	<p>لوقاية من الملاريا بالمناطق التي ستسافر إليها ينصح بتناول دواء دوكسيكلينا 100مغ.</p> <p><b>الجرعة الموصى بها:</b> قرص واحد يوميا (بالنسبة للأشخاص الذي يبلغ وزنهم أكثر من 45 كلغ) ويتم تناوله مع الأكل وكثير من السوائل بعد فطور الصباح وترك ساعة تمر قبل الذهاب الى الفراش او الاستلقاء.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ويتم البدء في تناوله قبل 24 أو 48 ساعة من الدخول الى المنطقة الجغرافية التي بها يكون بها مرض الملاريا شائعا.</li><li>• الاستمرار بذلك يوميا خلال فترة الإقامة.</li><li>• الاستمرار بذلك يوميا حتى مرور 28 يوما بعد مغادرة هذه المنطقة.</li></ul> <p><b>الأعراض الجانبية:</b> الأكثر شيوعا هي آلام الراس والغثيان والتقيؤ والحساسية تجاه الضوء والإصابة بالأمراض الفطرية.</p> <p><b>موانع الاستعمال:</b> فرط الحساسية من الدوكسيكلينا او التيتراسيكلينا الأخرى أو بعض السواغات الخاصة بالدواء والاستعمال للمتزامن مع الميثوكسي فلوران (مخدر). يقلل من فاعلية موانع الحمل الفموية ويزيد من فعالية مضادات التخثر. ولا يجب تناوله بالتزامن مع مضادات الحموضة أو مستحضرات الحديد، ولا يجب استخدامه أثناء الحمل أو خلال فترة الرضاعة .</p> <p><b>لا يجب ان تنسى انه</b> لا يضمن اي علاج وقائي مضاد للملاريا الحماية الكاملة لذلك فأول دفاع لمكافحه هذا المرض هو تحاشي لدغة البعوض.</p>
---	---

<p>defensa frente a la enfermedad es evitar la picadura de mosquitos.</p> <p>Embarazadas, niños y niñas son especialmente susceptibles de padecer un paludismo grave.</p> <p>En caso de que una semana después de entrar en zona de riesgo, o hasta tres meses después de abandonarla, aparezca fiebre, dolores articulares, malestar general o diarrea, acuda a consulta médica para descartar una posible malaria.</p> <p>En caso de que aparezca algún efecto secundario grave, debe interrumpir la medicación y acudir a consulta médica.</p> <p>Leer con detenimiento el prospecto del medicamento.</p> <p>SERVICIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN – CENTRO SALUD INTERNACIONAL Montesa, 22, Edif. A Planta Baja – 28006 MADRID</p>	<p>ان الحوامل والاطفال بصفه خاصة هم معرضون للإصابة بالمalaria الخطيرة.</p> <p>في حالة ما إذا ظهرت الحمى أو ألم المفاصل أو توعك عام أو اسهال بداية من الاسبوع الأول بعد الدخول الى منطقة الخطر او حتى بعد ثلاثة اشهر من مغادرتها فيجب الذهاب الى العيادة الطبية لاستبعاد امكانية الإصابة بمرض الملاريا.</p> <p>في حالة ما إذا ظهرت اي أعراض جانبية خطيرة يجب التوقف عن استعمال الدواء والذهاب الى العيادة الطبية</p> <p>اقرا بعناية الروشنة الطبية الخاصة بالدواء بعناية.</p> <p>خدمة الوقاية والترويج- مركز الصحة الدولية Montesa, 22, Edif. A Planta Baja – 28006 MADRID</p>
---	---