

PROPHYLAXIE FACE AU PALUDISME/MALARIA CHLOROQUINE (RESOCHIN)

Pour prévenir le paludisme/malaria à l'endroit où vous allez voyager, il est recommandé de prendre le médicament suivant : CHLOROQUINE (RESOCHIN).

Dose recommandée : 2 cachets à la fois **par semaine**, toujours le même jour de la semaine, à prendre après le repas avec un verre d'eau.

- Première prise une semaine **avant** l'entrée dans la zone géographique où le paludisme est endémique.
- Poursuivre la prise **hebdomadaire** tout au long du **séjour**.
- Poursuivre la prise **hebdomadaire** pendant 4 semaines **après** avoir abandonné la zone.

Effets secondaires : troubles gastrointestinaux (nausées et vomissements, douleurs abdominales, manque d'appétit, diarrhée, perte de poids), altérations de la vue.

Contre-indications : hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients contenus dans sa formulation, porphyrie, psoriasis, rétinopathie, myasthénie, arythmies cardiaques. Contre-indication de la prise simultanée avec des antiacides, des corticoïdes et du méthotrexate.

Grossesse à éviter au cours de la prise et pendant les trois mois suivants. Contre-indiqué en période d'allaitement.

NE PAS OUBLIER :

Aucune prophylaxie antipaludique n'assure une protection complète, la première défense contre la maladie étant d'éviter les piqûres de moustiques.

Les femmes enceintes et les enfants sont particulièrement susceptibles de souffrir d'un paludisme grave.

En cas de fièvre, de douleurs articulaires, de malaise général ou de diarrhée une semaine après l'arrivée dans la zone de risque ou jusqu'à trois mois après l'avoir abandonnée, cherchez assistance médicale pour exclure une possible malaria.

En cas d'apparition d'un effet secondaire grave, interrompre la prise du médicament et cherchez assistance médicale.

Lire attentivement la notice du médicament.