

PROPHYLAXIE FACE AU PALUDISME/MALARIA MÉFLOQUINE (LARIAM)

Pour prévenir le paludisme/malaria à l'endroit où vous allez voyager, il est recommandé de prendre le médicament suivant : MÉFLOQUINE (LARIAM), disponible en Espagne comme médicament étranger.

Dose recommandée : 1 cachet de 250 mg (pour les personnes pesant plus de 45 kg) **par semaine**, toujours le même jour de la semaine, à prendre avec des aliments et du liquide en abondance et sans mâcher.

- Première prise une semaine **avant** l'entrée dans la zone géographique à risque de paludisme.
- Poursuivre la prise **d'un cachet par semaine** tout au long du **séjour**.
- Poursuivre la prise **d'un cachet par semaine** pendant 4 semaines **après** avoir abandonné la zone.

Effets secondaires : les plus fréquents sont les maux de tête et les troubles intestinaux et du sommeil.

Contre-indications : l'hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients du médicament, des antécédents de maladies psychiatrique, y compris la dépression, l'arythmie cardiaque, une altération hépatique grave et des cadres convulsifs.

NE PAS OUBLIER :

Aucune prophylaxie antipaludique n'assure une protection complète, la première défense contre la maladie étant d'éviter les piqûres de moustiques.

Les femmes enceintes et les enfants sont particulièrement susceptibles de souffrir d'un paludisme grave.

En cas de fièvre, de douleurs articulaires, de malaise général ou de diarrhée une semaine après l'arrivée dans la zone de risque ou jusqu'à trois mois après l'avoir abandonnée, cherchez assistance médicale pour exclure une possible malaria.

En cas d'apparition d'un effet secondaire grave, interrompre la prise du médicament et chercher assistance médicale.

Lire attentivement la notice du médicament.

POINT DE VENTE : **PHARMACIE DE MÉDICAMENTS ÉTRANGERS**
C/SAGASTA, 6 METRO BILBAO HORAIRES : DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 14H00.

SERVICE DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION – CENTRE DE SANTÉ INTERNATIONALE

Montesa, 11 Edif. A Planta Baja – 28006 MADRID