



VACCIN CONTRE LA TYPHOÏDE :
VIVOTIF

La typhoïde est une maladie infectieuse bactérienne produite par la *Salmonella Typhi*, qui se transmet par la consommation d'eau et d'aliments contaminés.

Sa distribution est universelle, mais beaucoup plus fréquente dans les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique Centrale et du Sud et dans certaines zones rurales de la Méditerranée orientale.

VACCIN ORAL - VIVOTIF	
Indications	Personnes âgées de plus de 5 ans se dirigeant vers des zones endémiques.
Type de vaccin	Souche atténuée <i>Salmonella Typhi</i> Ty21a.
Schéma de vaccination	Trois capsules administrées sur 5 jours, le 1 ^{er} , 3 ^e et 5 ^e jour. À prendre avec des liquides froids et une heure avant le repas.
Efficacité	Efficace à partir de 15 jours après le début de l'administration. La durée minimum de protection est de 3 ans.
Contre-indications	Éviter de prendre des antibiotiques, des sulfonamides et des médicaments pour la prévention du paludisme, au minimum trois jours avant et trois jours après l'administration.
Effets secondaires	Céphalées, troubles gastrointestinaux, fièvre, exanthème (dans 1 à 10% des cas)
CONSERVATION	À CONSERVER AU FROID (Depuis l'achat jusqu'à la prise)

NE PAS OUBLIER QUE :

Il est recommandé de commencer la prise du vaccin au moins 15 jours avant l'arrivée à la zone de risque.

Il est important de suivre les mesures d'hygiène concernant l'eau et l'alimentation.

SERVICE DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION – CENTRE DE SANTÉ INTERNATIONAL

Montesa, 11 Edif. A Planta Baja – 28006 MADRID