



## PROPHYLAXIE FACE AU PALUDISME/MALARIA ATOVAQUONE-PROGUANIL

Pour prévenir le paludisme/malaria à l'endroit où vous allez voyager, il est recommandé de prendre le médicament suivant : ATOVAQUONE-PROGUANIL

**Dose recommandée :** 1 cachet **par jour** (pour les personnes pesant plus de 40 kg), à prendre avec des aliments, de préférence à teneur grasse, et du liquide en abondance, ou avec du lait entier, après le petit-déjeuner, laissant passer une heure avant de se coucher ou de s'allonger.

- Première prise 24 ou 48 heures **avant** l'entrée dans une zone géographique où le paludisme est endémique.
- Poursuivre la prise **quotidienne** tout au long du **séjour**.
- Poursuivre la prise **quotidienne** pendant 7 jours **après** avoir abandonné la zone.

Renouveler la prise en cas de vomissements au cours de la 1<sup>e</sup> heure après l'avoir effectuée.

**Effets secondaires :** les plus fréquents sont les maux de tête et les troubles gastrointestinaux.

**Contre-indications :** hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients du médicament et insuffisance rénale grave. Ne pas administrer conjointement avec de la rifampicine, des tétracyclines ni du métoprolol. Absence d'études sur l'utilisation au cours de la grossesse. Ne pas utiliser en période d'allaitement.

### NE PAS OUBLIER :

Aucune prophylaxie antipaludique n'assure une protection complète, la première défense contre la maladie étant d'éviter les piqûres de moustiques.

Les femmes enceintes et les enfants sont particulièrement susceptibles de souffrir d'un paludisme grave.

En cas de fièvre, de douleurs articulaires, de malaise général ou de diarrhée une semaine après l'arrivée dans la zone de risque ou jusqu'à trois mois après l'avoir abandonnée, chercher assistance médicale pour exclure une possible malaria.

En cas d'apparition d'un effet secondaire grave, interrompre la prise du médicament et chercher assistance médicale.

Lire attentivement la notice du médicament.