



## PROPHYLAXIE FACE AU PALUDISME/MALARIA

DOXYCYCLINE 100 mg

Pour prévenir le paludisme/malaria à l'endroit où vous allez voyager, il est recommandé de prendre le médicament suivant : DOXYCYCLINE 100 mg.

**Dose recommandée :** 1 cachet **par jour** (pour les personnes pesant plus de 45 kg), à prendre avec des aliments et du liquide en abondance, après le petit-déjeuner, laissant passer une heure avant de se coucher ou de s'allonger.

- Première prise 24 ou 48 heures **avant** l'entrée dans la zone géographique où le paludisme est endémique.
- Poursuivre la prise **quotidienne** tout au long du **séjour**.
- Poursuivre la prise **quotidienne** jusqu'à 28 jours **après** avoir abandonné la zone.

**Effets secondaires :** les plus fréquents sont les maux de tête, les nausées et les vomissements, la photosensibilité et les infections fongiques.

**Contre-indications :** hypersensibilité à la doxycycline ou à d'autres tétracyclines ou à l'un des excipients contenus dans sa formulation et l'utilisation simultanée avec du méthoxyflurane (anesthésique). Ce médicament réduit l'efficacité des contraceptifs oraux et augmente celle des anticoagulants. Contre-indication de la prise simultanée avec des antiacides et les préparations à base de fer. Contre-indiqué en cas de grossesse ou d'allaitement.

### NE PAS OUBLIER :

Aucune prophylaxie antipaludique n'assure une protection complète, la première défense contre la maladie étant d'éviter les piqûres de moustiques.

Les femmes enceintes et les enfants sont particulièrement susceptibles de souffrir d'un paludisme grave.

En cas de fièvre, de douleurs articulaires, de malaise général ou de diarrhée une semaine après l'arrivée dans la zone de risque ou jusqu'à trois mois après l'avoir abandonnée, chercher assistance médicale pour exclure une possible malaria.

En cas d'apparition d'un effet secondaire grave, interrompre la prise du médicament et chercher assistance médicale.

Lire attentivement la notice du médicament.