

CALENDARIO DE ACTIVIDAD DE PLAGAS / VECTORES PROBABLE EN LA CIUDAD DE MADRID. INFORMACIÓN WEB CORPORATIVA www.madridsalud.es

VECTOR - PLAGA		CATEG. ACTIVIDAD	ESTACIONALIDAD (MES AÑO)												
			ENE	FEB	MAR	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	
RATA (ALCANTARILLADO)	<i>Rattus norvegicus</i>	Actividad - Avisos													
RATA NEGRA (ZONAS VERDES)	<i>Rattus rattus</i>	Actividad - Avisos													
RATÓN (VÍA PÚBLICA)	<i>Mus spp</i>	Actividad - Avisos													
CUCARACHA NEGRA U ORIENTAL (ALCANTARILLADO)	<i>Blatta orientalis</i>	Actividad - Avisos													
CUCARACHA AMERICANA (ALCANTARILLADO)	<i>Periplaneta americana</i>														
MOSQUITOS CULICIDOS	<i>Culex spp</i>	Actividad adultos													
GARRAPATAS IXÓDIDAS EXTERIOR	<i>Varias spp</i>	Actividad													
MOSCA NEGRA	<i>Simulidae</i>	Actividad adultos-picaduras													
AVISPAS SOCIALES	<i>Varias spp</i>	Actividad - Avisperos													
ABEJAS (ENJAMBRES MÓVILES)	<i>Apis spp</i>	Enjambres													
ABEJAS (COLMENAS)	<i>Apis spp</i>	Colmenas estables													
HORMIGAS (EXTERIORES)	<i>Varias spp</i>														
CHINCHE HUMANO (#)	<i>Cimex lectularius</i>	Avisos													
INSECTOS "INVASORES OCASIONALES" (##)	<i>Varias spp</i>	Avisos													
TERMITA SUBTERRÁNEA	<i>Reticulotermes spp</i>	Enjambrado													
TERMITA MADERA SECA	<i>Kalotermes spp</i>	Enjambrado													
PROCESIONARIA DEL PINO	<i>Thaumatopea pytiocampa</i>	Orugas procesionarias													

(*) Los datos de estacionalidad indicados en la tabla se refieren a años con climatología dentro de los parámetros habituales de Madrid.

(**) Los datos de estacionalidad se refieren a plagas o vectores que presentan la totalidad o, al menos parte de su ciclo vital en Exteriores-vía pública. La infestación de interiores de edificios o locales, en la medida que evita o reduce las variaciones térmicas, limitaciones de acceso a agua, etc... puede reducir o incluso anular el carácter estacional propio de algunas plagas/vectores

(#) Es parásito interior obligado pero con un cierto patrón de estacionalidad relacionado con el incremento de las temperaturas y de la frecuencia en viajes.

(##) Insectos de vida libre o ambiental, normalmente irrelevantes desde el punto de vista de salud pública y que, bajo condiciones extremas de temperatura (calor-frío) y/o de sobrepoblación, acceden ocasionalmene a las viviendas.